

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL : XXXXX

ET FRANCHE-COMTÉ - CÔTE-D'OR - SAÔNE-ET-LOIRE - YONNE - NIÈVRE - JURA - DOUBS - HAUTE-SAÔNE - TERRITOIRE DE BELFORT 60 F.

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CEDEX - Tél. (80) 22.19.38

Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. P. DIJON 3405.12 K

Bulletin n° 132 - 4 juillet 1978

V I G N E

TORDEUSES DE LA GRAPPE : Dans la majorité des secteurs il n'y a pas lieu d'intervenir contre la première génération de vers. Toutefois en situations tardives (stade début floraison) un traitement pourrait encore se justifier si on observait une attaque sensible (au moins 3 glomérules pour 10 grappes).

ARBRES FRUITIERS



CARPOCAPSE DES POMMES :

Les fruits grossissant rapidement, la protection assurée par le premier traitement touche à sa fin et bien que les températures basses soient défavorables au ravageur, une nouvelle application est conseillée dans les tout prochains jours.

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER : Un dernier traitement est préconisé sur les arbres en parfait état sanitaire ; par contre pour les vergers contaminés présentant des taches sur feuilles ou sur fruits, la protection devra être poursuivie jusqu'à la récolte compte tenu du régime des pluies.

OÏDIUM DU POMMIER, PSYLLES DU POIRIER : Surveiller les plantations et en cas de nécessité ne pas hésiter à intervenir.

"ANTHRACNOSE" DU CERISIER : Les variétés sensibles "Marmotte" notamment, devront recevoir après récolte une deuxième application fongicide. Les produits polyvalents cités dans notre bulletin n° 129 du 9 juin 1978 sont également actifs contre la "criblure".

ARBUSTES À PETITS FRUITS

OÏDIUM DU CASSISSIER : Une nouvelle intervention est préconisée pour les cultures des Hautes-Côtes, les baies étant au stade de la véraison (voir nos bulletins n° 128 et 130 des 2 et 15 juin 1978).

P.16.1

CULTURES LÉGUMIÈRES

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE : Les premières taches de mildiou ayant été découvertes la semaine dernière, nous conseillons de renouveler la protection des cultures dans les tout prochains jours.

DORYPHORE : S'il y a lieu traiter en même temps contre le doryphore.

MILDIOU DE L'OIGNON : Maintenir une excellente protection fongicide et si nécessaire intervenir en même temps contre les larves de la mouche de l'oignon en pulvérisation abondante avec : chlorfenvinphos 50 g. de matière active/hl (Birlane, Psilatox) ou trichloronate 90 g. m.a./hl (Phytosol 50).

SEPTORIOSE : La maladie commençant à s'étendre, renouveler le traitement conseillé fin juin dans les premiers jours de la semaine prochaine.

PUCERONS DIVERS (haricots, bettes, choux, etc...) : Surveiller l'évolution des populations de pucerons afin d'intervenir éventuellement en respectant les délais d'emploi avec des aphicides autorisés.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie,
Chef de la Circonscription phytosanitaire
"Bourgogne et Franche-Comté"

G. VARLET